

Druhy ptáků 3

Pěvci

Ptáčníková Ivana

Pěvci

Hlavní znaky:

- V krku hlasové ústrojí → zpěv – zpěvem označují své teritorium, vábí samičku,
-- typický pro jednotlivé druhy
- Dělíme je podle potravy na
 - semenožravé – zobák krátký, silný, kuželovitý
 - hmyzožravé - zobák tenký, protáhlý
 - všežravé – zobák velký a hrubý
- Mláďata – krmivá, líhnou se neopeřená
- Stěhovaví i nestěhovaví



SCHHAPP




Zástupci

- Semenožraví – vrabec domácí
pěnkava obecná
strnad obecný
stehlík obecný
hýl obecný
zvonek zelený

- Hmyzožraví - sýkora koňadra, sýkora modřinka,
vlastovka obecná
jiříčka obecná
skřivan polní
konipas bílý
slavík obecný
kos černý
chocholouš obecný
červenka obecná
dlask tlustozobý
drozd zpěvný
špaček obecný
- Všežraví –
sojka obecná
straka obecná
vrány
havran obecný

Semenožraví

Vrabec domácí



- Nejrozšířenější
- Nenápadné zbarvení
- Hnízdí 2x do roka
- Cvrlikání „čimčarání“

Samec



Samice



Pěnkava obecná

- Samci zůstávají
- Samičky odlétají na zimu
- Úhledná hnízda
- Samička - vybarvena nenápadně v různých odstínech hnědé a béžové. Pouze stejné „křídelními znaky“ a nenápadná šedavá kresba na hlavičce napovídá, do kterého druhu vlastně patří.



Sameček



Samička

Strnad obecný

- Hnízdí v otevřené krajině
na křovinatých mezích



Stehlík obecný

- Žije v parcích a zahradách
- Pestře zbarvený, okolo zobáku červené zbarvení
- Na podzim velká hejna



Hýl obecný

Přezimuje u nás



Zvonek zelený

Část zvonků odlétá na jih na zimu



Hmyzožraví

Sýkory



Sýkora koňadra



Sýkora babka



Sýkora modřinka



Sýkora azurová

Vlaštovka obecná



Jiříčka obecná



Konipas bílý



Stěhovavý

Skřivan polní



Hnízdo je na zemi v
nízkém porostu,
většinou u hustšího trsu.
Stěhovavý

Slavík obecný



SLAVÍK zpěv – „klokot“

<https://www.youtube.com/watch?v=qbc5ba85dvU>

Chocholouš obecný



Kos černý



Hnízdo s vejci



Samice



2 dny stará mláďata



Mláďata



Červenka obecná



Špaček obecný



Dlask tlustozobí



Drozd zpěvný



Všežraví

Sojka obecná



Sojka obecná



Straka obecná



Straka obecná

Vrány

V oblastech společného výskytu (celé území ČR) je běžné křížení obou druhů. Kříženci vykazují různé barevné přechody (rozsah šedé barvy) mezi oběma druhy.



Vrána černá (poddruh *Corvus corone corone*)



Vrána šedá

Havran obecný



V České republice se vyskytuje po celý rok, místy v hojném počtu. Nejpočetněji je na našem území zastoupen v zimě, kdy se do střední Evropy hromadně stahují ptáci z východní a severovýchodní Evropy. Dle odhadu Jiřího Mlíkovského v ČR zimují dva až čtyři miliony jedinců